

## COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE BAJA CALIFORNIA

AVANCE DE LABORES PROFILACTICAS DE DESVARE Y BARBECHO CICLO P/V 2017

SUPERFICIE ESTABLECIDA DE ALGODÓN 2017.- **26,434-89**

**AI 16 DE MARZO 2018**

COSECHADO	DESVARADO	DISQUEADO	BARBECHADO
26,301-89	22,468-68	21,482-27	<b>20,321-62</b>
POR COSECHAR <b>0.5%</b>	POR DESVARAR <b>15.0%</b>	POR DISQUEAR <b>18.7%</b>	POR BARBECHAR <b>23.1%</b>
133-89	3,966-21	4,952-62	<b>6,113-27</b>

CONSTANCIAS DE DE DESVARES Y BARBECHOS ENTREGADAS

No de predios	Superficie	% de constancias entregadas
<b>1,188</b>	<b>17,669-59</b>	<b>66.8%</b>

### Ciclo primavera verano 2018.

Expedición de pre-permisos del cultivo de algodón, por parte del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Baja California

Se estima una siembra de 35,000-00has.

semana	predios	Superficie
15-19 enero	117	1,518-00
22-26 enero	148	1,838-08
29 ene-02 feb.	303	3,698.08
05-09 febrero	232	2,803-73
12-16 febrero	263	3,219-49
19-23 febrero	241	3,062-20
26-02 marzo	275	3,611-40
05—09 marzo	260	3,562-88
12-16 marzo	235	3,125-50
<b>Total</b>	<b>2,047</b>	<b>26,439-56 (75.5%)</b>

**PIOJO HARINOSO DEL ALGODONERO.- SE INICIA EN EL PRESENTE CICLO AGRICOLA P/V 2018 MONITOREO EN MALEZAS COLINDANTES DE PREDIOS EN LOS QUE SE DETECTO LA PRESENCIA DE DICHA PLAGA EN EL CICLO P/V 2017.**

**COMO RESULTADO DEL MONITOREO DE PIOJO HARINOSO DEL ALGODONERO REALIZADO EL DIA 16 DE MARZO, SE OBTUVIERON LOS SIGUIENTES DATOS.**

**SE MONITOREARON EN TOTAL 22 PREDIOS CON 408.34 HA.**

**DE LOS CUALES EN 8 PREDIOS CON 175.92 HA SE DETECTO LA PRESENCIA DE PIOJO HARINOSO DEL ALGODONERO PRINCIPALMENTE EN PREDIOS SIN DESVARAR Y CON REBROTE DE PLANTA.**

**EN 14 PREDIOS CON 232.42 HA NO SE DETECTO LA PRESENCIA DE PIOJO HARINOSO DEL ALGODONERO, CABE MENCIONAR QUE EN ESTOS PREDIOS SE ENCONTRABAN DESVARADOS Y BARBECHADOS.**

**NO SE DETECTO PRESENCIA DE LA PLAGA EN MALESAS HOSPEDANTES COLINDANTES DE PREDIOS CON ANTECEDENTE DE DICHA PLAGA.**